

INDICACIONES: PARA EL TRATAMIENTO DE DEFICIENCIAS VITAMÍNICAS.

FÓRMULA:	CADA TABLETA CONTIENE:
BETA CAROTENO 20% (EQUIVALE A 5.000 UI BETA CAROTENO)	15,75 mg
ASCORBATO DE CALCIO (EQUIVALE A 222 mg DE VITAMINA C)	284,20 mg
ASCORBATO DE POTASIO (EQUIVALE A 116 mg DE VITAMINA C)	170,50 mg
ASCORBATO DE MAGNESIO (EQUIVALE A 73 mg DE VITAMINA C)	85,20 mg
ASCORBATO DE ZINC (EQUIVALE A 22 mg DE VITAMINA C)	28,40 mg
COLECALCIFEROL (EQUIVALE A 150 UI DE VITAMINA D)	1,65 mg
SUCCINATO DE D-ALFA TOCÓFERIL (EQUIVALE A 150 UI DE VITAMINA E)	130,20 mg
VITAMINA K 1% (EQUIVALE A 20 µg DE VITAMINA K)	2,20 mg
HIDROCLORURO DE TIAMINA (EQUIVALE A 9 mg DE TIAMINA)	9,50 mg
RIBOFLAVINA (EQUIVALE A 9 mg DE RIBOFLAVINA)	9,60 mg
NIACINA (EQUIVALE A 3,3 mg DE NIACINA)	3,50 mg
NIACINAMIDA (EQUIVALE A 10 mg DE NIACINAMIDA)	10,50 mg
HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA (EQUIVALE A 9 mg DE VITAMINA B6)	9,50 mg
ÁCIDO FÓLICO (EQUIVALE A 333 µg DE ÁCIDO FÓLICO)	0,35 mg
CIANOCOBALAMINA 1% (EQUIVALE A 20 µg DE VITAMINA B12)	2,20 mg
BIOTINA 1% (EQUIVALE A 100 µg DE BIOTINA)	11,00 mg
PANTOTENATO DE CALCIO (EQUIVALE A 30 mg DE ÁCIDO PANTOTÉNICO)	35,00 mg
INOSITOL (EQUIVALE A 50 mg DE INOSITOL)	51,50 mg
BITARTRATO DE COLINA (EQUIVALE A 33 mg DE BITARTRATO DE COLINA)	33,70 mg
COENZIMA Q10 (EQUIVALE A 4 mg DE CoQ10)	4,00 mg
ÁCIDO ALFA LIPOICO (EQUIVALE A 5 mg DE ÁCIDO ALFA LIPOICO)	5,00 mg
EXCIPIENTE C.B.P.	1 TABLETA

DOSIS: 3 TABLETAS AL DÍA, DE PREFERENCIA CON LOS ALIMENTOS.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

CONTRAINDICACIONES: HIPERSENSIBILIDAD A CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DE LA FÓRMULA. CUALQUIER PERSONA QUE ESTÉ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO O ESTÉ SIENDO ACTIVAMENTE TRATADA ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA, DEBERÁ CONSULTAR CON ALGÚN PROFESIONAL DE LA SALUD, ANTES DE CONSUMIR ESTE PRODUCTO.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: CLORANFENICOL, TETRACICLINA, ADENOFUCOCIDO DIGITALICA O GLUCÓCIDO DIGITELICA, SALES DE POTASIO, COLESTE RAUNICO, CIUSETI DE LAS COLCHICINA, LEVODOPA, METOTREXATO, SULFONAMIDAS, PRIMIDONA, ELOMICINES, WARFARINA.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: RARAMENTE PODRÍA CAUSAR NÁUSEAS, DIARREA, CONSTIPACIÓN, DOLOR DE CABEZA O INSOMNIO.

USO PEDIÁTRICO: NO SE RECOMIENDA SU USO.

EN MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

SI PERSISTEN LAS MOLESTIAS CONSULTE A SU MÉDICO.

CONSERVESE EL FRASCO BIEN TAPADO A TEMPERATURA AMBIENTE A NO MAS DE 30°C.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

REG. NO. 011V2004SSA VI

PRECIO MÁXIMO AL PÚBLICO:

HECHO EN EUA POR: USANA HEALTH SCIENCES, INC., 3838 W. PARKWAY BLVD., SLIC, UT 84120

IMPORTADO EN MÉXICO POR: OFFENBACH MEXICANA S.A. DE C.V., ACUEDUCTO NO. 15 COL. REFORMA SOCIAL, MÉXICO, D.F., C.P. 11650 www.usana.com.mx

© MARCA REGISTRADA

PRODUCTO CODIGO 103.110600

LB103.110602